

Nombres complexes

I — Définition de \mathbb{C} – Écriture algébrique

Définition 1.1 — Nombres complexes

On appelle **ensemble des nombres complexes** et on note \mathbb{C} l'ensemble \mathbb{R}^2 muni des deux opérations suivantes

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \forall (x', y') \in \mathbb{R}^2,$$

addition	$(x, y) + (x', y') \stackrel{\text{déf.}}{=} (xx', yy')$
multiplication	$(x, y) \times (x', y') \stackrel{\text{déf.}}{=} (xx' - yy', xy' + x'y)$

Définition 1.2 — Partie réelle, partie imaginaire

Soit z un nombre complexe. Il existe un unique couple (x, y) de réels tels que $z = x + iy$.

Le réel x est la **partie réelle** de z notée $\operatorname{Re}(z)$ et y est sa **partie imaginaire**, notée $\operatorname{Im}(z)$.

Si $\operatorname{Re}(z) = 0$, on dit que z est un **imaginaire pur** et si $\operatorname{Im}(z) = 0$ on dit que z est un **réel**.

On identifie le sous-ensemble $\{(x, 0) \text{ avec } x \in \mathbb{R}\}$ de \mathbb{R}^2 avec \mathbb{R} . L'ensemble des imaginaires purs est noté $i\mathbb{R}$.

Propriété 1.3 — Propriété des parties réelles et imaginaires

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$

$$\operatorname{Re}(z + z') = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z') \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(z + z') = \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z')$$

Si $\lambda \in \mathbb{R}$ alors

$$\operatorname{Re}(\lambda z) = \lambda \operatorname{Re}(z) \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(\lambda z) = \lambda \operatorname{Im}(z)$$

Théorème 1.4 — Cas d'égalité

Soit $(x, x', y, y') \in \mathbb{R}^4$:

$$x + iy = x' + iy' \iff x = x' \quad \text{et} \quad y = y'$$

Définition 1.5 — Conjugué d'un complexe

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$, avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

On appelle **conjugué** de z et on note \bar{z} le complexe $\bar{z} \stackrel{\text{déf.}}{=} x - iy$.

Propriété 1.6 — Conjugaison et opérations

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$

$$\begin{aligned} \overline{\overline{z}} &= z & \overline{z + z'} &= \overline{z} + \overline{z'} \\ \overline{zz'} &= \overline{z}\overline{z'} & \overline{z^n} &= \overline{z}^n \quad (n \in \mathbb{N}) & \overline{\frac{1}{z}} &= \frac{1}{\overline{z}} \end{aligned}$$

Propriété 1.7 — Forme algébrique de l'inverse

Si $z \in \mathbb{C}^*$, $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, alors

$$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{z\overline{z}} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$$

Propriété 1.8 — Soit $z \in \mathbb{C}$:

- $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}$ et $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$;
- z est réel si et seulement si $z = \overline{z}$ et z est imaginaire pur si et seulement si $z = -\overline{z}$.

Il existe un couple (ρ, θ) de réels tels que

$$\rho \in \mathbb{R}_+, \quad \theta \in \mathbb{R}, \quad x = \rho \cos \theta \quad \text{et} \quad y = \rho \sin \theta$$

- Le réel ρ est unique : $\rho^2 = x^2 + y^2$. C'est le **module** de z .
- Si $z = 0$ alors θ est quelconque dans \mathbb{R} .
- Si $z \neq 0$ alors θ est défini à 2π près. Chaque valeur possible de θ est un **argument** de z . L'unique réel $\theta_0 \in]-\pi ; \pi]$ vérifiant la relation précédente s'appelle l'**argument principal** de z . L'ensemble des arguments de z est

$$\{\theta_0 + 2k\pi, \text{ avec } k \in \mathbb{Z}\}$$

II — Notation exponentielle**Théorème & Définition 2.1 — Coordonnées polaires**

Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$, avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Théorème 2.2 — Notation exponentielle

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Il existe un couple $(\rho, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ tel que

$$z = \rho e^{i\theta} \stackrel{\text{déf.}}{=} \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\begin{aligned} |zz'| &= |z| |z'| & \left| \frac{z}{z'} \right| &= \frac{|z|}{|z'|} \\ |z| = 0 &\iff z = 0 & |z| &= |\bar{z}| \\ |\operatorname{Re}(z)| &\leq |z| & |\operatorname{Im}(z)| &\leq |z| \end{aligned}$$

Propriété 2.3 — D'après ce qui précède, on a la relation fondamentale

$$e^{i(\alpha+\beta)} = e^{i\alpha} e^{i\beta}$$

et donc

$$\begin{aligned} e^{-i\alpha} &= \frac{1}{e^{i\alpha}} & e^{i(\alpha-\beta)} &= \frac{e^{i\alpha}}{e^{i\beta}} \\ (e^{i\alpha})^n &= e^{in\alpha} & (n \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Propriété 2.4 — Cas d'égalité

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, de notations exponentielles $z = \rho e^{i\alpha}$ et $z' = \rho' e^{i\beta}$

$$z = z' \iff \rho = \rho' \quad \text{et} \quad \exists k \in \mathbb{Z}, \alpha = \beta + 2k\pi$$

Propriété 2.5 — Propriétés du module

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$:

Théorème 2.6 — Inégalité triangulaire

Si z et z' sont deux complexes, alors

$$|z + z'| \leq |z| + |z'| \quad \text{et} \quad ||z| - |z'|| \leq |z - z'|$$

Corollaire 2.7 — Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$: $|c - a| \leq |b - a| + |c - b|$

Propriété 2.8 — Soit $(z, z') \in (\mathbb{C}^*)^2$.

On note parfois $\arg(z)$ un argument de z . Dans ce cas

- $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') \quad [2\pi]$
- $\arg(az) = \arg(z) \quad [2\pi] \quad \text{si } a \in \mathbb{R}_+^*$
- $\arg(az) = \pi + \arg(z) \quad [2\pi] \quad \text{si } a \in \mathbb{R}_-^*$
- $\arg(z^n) = n \arg(z) \quad [2\pi]$
- $\arg(1/z) = -\arg(z) \quad [2\pi]$
- $\arg(z/z') = \arg(z) - \arg(z') \quad [2\pi]$
- $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) \quad [2\pi]$

III — Applications des nombres complexes**Définition 3.1 — Exponentielle complexe**

Soit $z \in \mathbb{C}$. On note $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}$.

On définit l'exponentielle de z par

$$\exp(z) \stackrel{\text{def.}}{=} \exp(x) e^{iy} = e^x (\cos(y) + i \sin(y))$$

Propriété 3.2 — Soit z et z' deux complexes. On a

$$\exp(z + z') = \exp(z) \exp(z')$$

Propriété 3.3 — Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Par définition $\cos \theta \stackrel{\text{def.}}{=} \operatorname{Re}(e^{i\theta})$ et $\sin \theta \stackrel{\text{def.}}{=} \operatorname{Im}(e^{i\theta})$

Proposition 3.4 — Formules d'Euler

Soit $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Proposition 3.5 — Formules de Moivre

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On a

$$e^{in\theta} = (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

ou de manière équivalente

$$\cos(n\theta) = \operatorname{Re} \left[(\cos \theta + i \sin \theta)^n \right]$$
$$\sin(n\theta) = \operatorname{Im} \left[(\cos \theta + i \sin \theta)^n \right]$$

